

Утвержден
приказом ГОБУЗ «ОКОД»
от 30.12.2022 № 388

**Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения,
назначаемых по решению врачебной комиссии ГОБУЗ «ОКОД»**

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)/фармакологическая группа	Лекарственные препараты	Лекарственные формы	Показания к применению
N02BB02	Метамизол натрия/ Анальгетическое ненаркотическое средство	Анальгин	Таблетки	Тяжелый острый и хронический болевой синдром при травмах и послеоперационном болевом синдроме, при коликах, при онкологических заболеваниях и других состояниях, где противопоказаны другие терапевтические меры, лихорадка, устойчивая к другим методам лечениям
N02BB02	Метамизол натрия/ Анальгетическое ненаркотическое средство	Анальгин	Раствор для в/в и в/м введения	Тяжелый острый и хронический болевой синдром при травмах и послеоперационном болевом синдроме, при коликах, при онкологических заболеваниях и других состояниях, где противопоказаны другие терапевтические меры, лихорадка, устойчивая к другим методам лечениям
D08AX	Антисептики и дезинфицирующие средства/ Антисептическое средство	Бриллиантовый зеленый	Раствор для наружного применения (спиртовой)	Свежие послеоперационные и посттравматические рубцы, мейбомит, блефарит, пиодермия, ссадины, порезы, нарушения целостности кожных покровов
A03BB01	Гиосцина бутилбромид/ М-холиноблокатор	Бускопан	Таблетки, покрытые оболочкой	Почечная колика, желчная колика, спастическая дискинезия желчевыводящих путей и желчного пузыря, холецистит, кишечная колика, пилороспазм, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения (в составе комплексной терапии), альгодисменорея, синдром раздраженного кишечника (симптомы включают боли в области живота, болезненные спазмы кишечника, вздутие и метеоризм, диарею, запор)
J01DD54	Цефтриаксон в комбинации с другими препаратами/ антибиотик-цефалоспорин+бета-лактамаз ингибитор	Бродсеф-С	Порошок для приготовления раствора для в/в и в/м введения	Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к комбинации цефтриаксона с сульбактамом возбудителями: - инфекции почек и мочевыводящих путей; - инфекции органов брюшной полости (перитонит, инфекции желчных путей и желудочно-

				<p>кишечного тракта);</p> <ul style="list-style-type: none"> - инфекции нижних дыхательных путей (в т.ч. пневмония); - инфекции ЛОР-органов (в т.ч. острый средний отит); - бактериальный менингит; - септицемия; - инфекции костей, суставов; - инфекции кожи и мягких тканей (в т.ч. раневые инфекции); - болезнь Лайма; - инфекции половых органов, включая неосложненную гонорею. <p>Инфекционные заболевания у пациентов со сниженным иммунитетом.</p> <p>Профилактика послеоперационных инфекций</p>
C05BA53	Гепарин в комбинации с другими препаратами/ Антикоагулянтное средство прямого действия для местного применения+прочие препараты	Гепариновая мазь	Мазь для наружного применения	Тромбофлебит поверхностных вен поверхностный перифлебит; подкожная гематома; постинъекционный и постинфузионный флебит; поверхностный мастит; локализованные инфильтраты и отеки травмы и ушибы (в т.ч. мышечной ткани сухожилий суставов); наружный геморрой воспаление послеродовых геморроидальных узлов; лимфедема (слоновость) лимфангит
B02BC07	Коллаген/Гемостатическое средство для местного применения	Губка гемостатическая	Губка гемостатическая	В качестве гемостатического средства при капиллярных и паренхиматозных кровотечениях из: синусов твердой мозговой оболочки; костно-мозгового канала; альвеолярной лунки после удаления зуба; паренхиматозных органов (в частности, после резекции печени); ложа желчного пузыря после холецистэктомии
J01XX	Хинолина производные/ Противомикробное средство - хиноксалин	Диоксидин	Раствор для внутривполостного и наружного применения	Гнойные бактериальные инфекции вызванные чувствительной микрофлорой при неэффективности других химиотерапевтических средств или их плохой переносимости. Внутривполостное введение - гнойные процессы в грудной и брюшной полости при гнойных плевритах эмпиемах плевры абсцессах легких перитонитах циститах ранах с наличием глубоких гнойных полостей (абсцессы мягких тканей флегмоны тазовой клетчатки послеоперационные раны

				мочевых и желчевыводящих путей гнойный мастит и др.) для профилактики инфекционных осложнений после катетеризации мочевого пузыря. Наружное применение - поверхностные и глубокие раны различной локализации длительно не заживающие раны и трофические язвы флегмоны мягких тканей инфицированные ожоги гнойные раны при остеомиелитах
V04CH02	Другие диагностические средства/Диагностическое средство	Индигокармин	Раствор для инъекций	Исследование выделительной функции почек, в том числе почечных лоханок и мочеточников. Для визуального выявления нарушений целостности полостных органов и протяженности свищевых ходов
M02AX10	Местнораздражающее средство/ Местнораздражающее средство растительного происхождения	Камфорный спирт	Раствор для наружного применения (спиртовой)	Миалгия миозит артралгия ишиас профилактика образования пролежней
A06AB05	Касторовое масло/ Слабительное средство растительного происхождения	Касторовое масло	Масло для приема внутрь	Запор, подготовка кишечника перед диагностическими процедурами
J01FF02	Линкомицин/ Антибиотик группы линкозамидов	Линкомицина гидрохлорид	Раствор для инфузий и в/м введения	Бактериальные инфекции вызванные чувствительными к линкомицину микроорганизмами (прежде всего Staphylococcus spp. и Streptococcus spp. особенно микроорганизмами устойчивыми к пенициллинам а также при аллергии к пенициллинам): сепсис подострый септический эндокардит абсцесс легкого эмпиема плевры плеврит отит остеомиелит (острый и хронический) гнойный артрит послеоперационные гнойные осложнения раневая инфекция инфекции кожи и мягких тканей (пиодермия фурункулез флегмона рожа)
D11AX	Другие иммуностимуляторы/ Репарации тканей стимулятор	Метилурациловая мазь	Мазь для наружного и местного применения	В составе комплексной терапии. Вялозаживающие раны, ожог, фотодерматит. Профилактика реакций кожи при облучении новообразований с невысокой радиочувствительностью, уменьшения симптомов лучевого дерматита и поздних сращений стенок (окклюзии) влагетища - в случае лучевой терапии новообразований гениталий
A03DA02	Метамизол натрия в комбинации с другими препаратами, кроме	Спазмалин	Раствор для в/в и в/м введения	Болевой синдром (слабо или умеренно выраженный) при спазмах гладкой мускулатуры

	психолептиков/ Анальгезирующее средство комбинированное (анальгезирующее ненаркотическое средство + спазмолитическое средство)			внутренних органов: почечная колика, спазм мочеточника и мочевого пузыря; желчная колика, кишечная колика; дискинезия желчевыводящих путей, постхолецистэктомический синдром, хронический колит; альгодисменорея. Для кратковременного лечения: артралгия, миалгия, невралгия, ишиалгия. В качестве вспомогательного лекарственного средства: заболевания органов малого таза, болевой синдром после хирургических вмешательств и диагностических процедур
N05AL03	Тиаприд/ Антипсихотическое средство (нейролептик)	Тиаприд	Таблетки	Купирование психомоторного возбуждения и агрессивных состояний, особенно при хроническом алкоголизме или в пожилом возрасте. Упорный интенсивный болевой синдром. Различные типы хореи, синдром Жилля де ла Туретта
B01AB06	Надропарин/ Антикоагулянтное средство прямого действия	Фраксипарин	Раствор для подкожного введения	Профилактика тромбозов и тромбоэмболических осложнений: при общехирургических и ортопедических вмешательствах; у больных с высоким риском тромбообразования (при острой дыхательной и/или сердечной недостаточности в условиях отделения интенсивной терапии, нестабильной стенокардии, инфаркте миокарда без зубца Q). Лечение тромбозов и тромбоэмболий. Профилактика свертывания крови во время гемодиализа
N05AF03	Хлорпротиксен/ Антипсихотическое средство (нейролептик)	Хлорпротиксен	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	Шизофрения и другие психозы протекающие с психомоторным возбуждением, ажитацией и тревогой. Абстинентный синдром при алкоголизме и наркоманиях. Депрессивные состояния, неврозы, психосоматические расстройства с тревогой, напряжением, беспокойством, бессонницей, нарушениями сна. Эпилепсия и олигофрения, сочетающиеся с психическими нарушениями: возбуждением, ажитацией, лабильностью настроения и нарушениями поведения. Боли (в комбинации с анальгетиками). Гериятрия: гиперактивность, возбуждение, раздражительность

				спутанность сознания тревожность нарушения поведения и сна
A03AX13	Другие препараты применяемые при функциональных желудочно-кишечных расстройствах/ Ветрогонное средство	Эспумизан	Эмульсия для приема внутрь	Симптомы избыточного образования и скопление газов в ЖКТ (метеоризм, повышенное газообразование в послеоперационном периоде); симптомы избыточного газообразования, вызванного функциональной диспепсией; подготовка к диагностическим исследованиям органов брюшной полости и малого таза (УЗИ, рентгенография, эзофагогастродуоденоскопия и др.), в т.ч. в качестве добавки к суспензиям контрастных средств для получения изображения методом двойного контрастирования; острые отравления моющими средствами, содержащими пенообразующие вещества (тензиды), в качестве пеногасителя
A02BC04	Рабепразол/ Средство понижающее секрецию желез желудка - протонного насоса ингибитор	Рабелок	Лиофилизат для приготовления раствора для в/в введения	Рабепразол для внутривенного введения показан в качестве альтернативы для тех пациентов, для которых пероральная терапия невозможна или не показана: острая язва двенадцатиперстной кишки с кровотечением или тяжелым эрозивным поражением; острая язва желудка с кровотечением или тяжелым эрозивным поражением; краткосрочная терапия гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) с эрозивными или язвенными поражениями; профилактика аспирации кислым содержимым желудка; стресс-индуцированное поражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта в критических состояниях; патологические гиперсекреторные состояния включая синдром Золлингера-Эллисона; ступенчатый переход (ступенчатая терапия) с перорального приема рабепразола в случае если пациент предварительно находился на лечении пероральным рабепразолом и временно не может принимать пероральные лекарственные средства по любой причине
D08AX	Другие антисептики и	Линимент	Линимент для	Неинфицированные, длительно

	дезинфицирующие средства/ Антисептики и дезинфицирующие средства в комбинациях Регенеранты и репаранты в комбинациях	бальзамический (по Вишневскому)	наружного применения	незаживающие послеоперационные, посттравматические раны кожи и мягких тканей
C01AX	Сердечные гликозиды другие/ Сердечные гликозиды и негликозидные кардиотонические средства	Коргликлард	Раствор для в/в введения	В составе комплексной терапии хронической сердечной недостаточности II функционального класса (при наличии клинических проявлений) и III-IV функционального класса по классификации NYHA, тахисистолическая форма мерцания и трепетания предсердий пароксизмального и хронического течения (особенно в сочетании с хронической сердечной недостаточностью)
N01BB52	Лидокаин в комбинации с другими препаратами/ Антисептическое средство + местноанестезирующее средство (Местные анестетики в комбинациях) Антисептическое средство + местноанестезирующее средство (Антисептики и дезинфицирующие средства в комбинациях)	Катеджель с лидокаином	Гель для местного применения	Профилактика инфекции, анестезия при оперативных и диагностических эндоскопических вмешательствах в урологии, гинекологии, проктологии, все формы эндоскопии, замена фистульных катетеров, интубация. Применяется в комплексной терапии при купировании симптомов воспаления (сопровождающихся болевым синдромом) слизистой оболочки мочеиспускательного канала, влагалища, цервикального канала и прямой кишки
J01XX	Прочие антибактериальные препараты/ Другие синтетические антибактериальные средства	Диоксисепт	Раствор для инъекций, раствор для внутривполостного введения и наружного применения	Гнойные бактериальные инфекции, вызванные чувствительной микрофлорой при неэффективности других химиотерапевтических средств или их плохой переносимости. Наружное применение - поверхностные и глубокие раны различной локализации, длительно незаживающие раны и трофические язвы, флегмоны мягких тканей, инфицированные ожоги, гнойные раны при остеомиелитах. Внутриполостное введение - гнойные процессы в грудной и брюшной полости, при гнойных плевритах, эмпиемах плевры, абсцессах легкого, перитонитах, циститах, ранах с наличием глубоких гнойных полостей (абсцессы мягких тканей, флегмоны тазовой клетчатки, послеоперационные раны мочевых и желчевыводящих

				путей, гнойный мастит и др.). Эндотрахеальное введение - гнойные трахеобронхиты. Внутривенное введение - тяжелые септические состояния (в том числе у больных ожоговой болезнью), гнойный менингит, тяжелые гнойно-воспалительные процессы с симптомами генерализации инфекции
L01XD	Сенсибилизирующие препараты, используемые для фотодинамической/лучево й терапии/ Другие противоопухолевые средства	Радахлорин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий	Флюоресцентная диагностика рака кожи; фотодинамическая терапия поверхностных опухолей кожи (исключая меланому); фотодинамическая терапия предопухолевой (дисплазия I-III степени, эрозия) и опухолевой (рак in situ) патологии шейки матки
L01XD	Сенсибилизирующие препараты, используемые для фотодинамической/лучево й терапии/ Другие противоопухолевые средства	Фоторан	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	Фотодинамическая терапия злокачественных новообразований – рак кожи (плоскоклеточный и базальноклеточный), меланома, внутрикожные и подкожные метастазы меланомы, рак молочной железы и его внутрикожные метастазы, рак слизистых оболочек, в т.ч. полых органов (вульвы, шейки матки (в т.ч. цервикальные интраэпителиальные неоплазии I- III ст.), пищевода, прямой кишки и т.д.); – диагностика злокачественных новообразований спектрофлуоресцентным методом
L01XD	Сенсибилизирующие препараты, используемые для фотодинамической/лучево й терапии/ Другие противоопухолевые средства.	Хлорин Е6	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	Фотодинамическая терапия злокачественных новообразований – рак кожи (плоскоклеточный и базальноклеточный), меланома, внутрикожные и подкожные метастазы меланомы, рак молочной железы и его внутрикожные метастазы, рак слизистых оболочек, в т.ч. полых органов (вульвы, шейки матки (в т.ч. цервикальные интраэпителиальные неоплазии I- III ст.), пищевода, прямой кишки и т.д.); диагностика злокачественных новообразований спектрофлуоресцентным методом
R07AB	Стимуляторы дыхания/ Антисептики и дезинфицирующие средства Местнораздражающие	Аммиак	Раствор для наружного применения и ингаляций	Обморочные состояния, дезинфекция кожи рук, нейтрализация кислых токсинов при укусах насекомых

	средства Стимуляторы дыхания			
D08AG03	Йод/ Антисептики и дезинфицирующие средства в комбинациях Местнораздражающие средства в комбинациях	Йод	Раствор для наружного применения (спиртовой)	Инфекционно-воспалительные заболевания кожи, ссадины, порезы, микротравмы, раны; миозит, невралгия, воспалительные инфильтраты; обработка краев ран, кожи перед проведением инъекций, пункций, катетеризации
A07BC	Кишечные адсорбенты/ Энтеросорбирующее средство	Энтеросгель	Паста для приема внутрь	В качестве детоксикационного средства: - острые и хронические интоксикации различного происхождения; - острые отравления сильнодействующими и ядовитыми веществами, в том числе лекарственными препаратами и алкоголем, алкалоидами, солями тяжёлых металлов; - острые кишечные инфекции любого генеза в составе комплексной терапии (токсикоинфекции, сальмонеллёз, дизентерия, диарейный синдром неинфекционного происхождения, дисбактериоз); - гнойно-септические заболевания, сопровождающиеся выраженной интоксикацией, в составе комплексной терапии; - пищевая и лекарственная аллергия; - гипербилирубинемия (вирусные гепатиты) и гиперазотемия (хроническая почечная недостаточность); - с целью профилактики хронических интоксикаций работникам вредных производств (профессиональные интоксикации химическими агентами политропного действия, ксенобиотиками, инкорпорированными радионуклидами, соединениями свинца, ртути, мышьяка, нефтепродуктами, органическими растворителями, оксидами азота, углерода, фторидами, солями тяжёлых металлов)
B06AB	Крови препараты другие/ Регенерации тканей стимулятор	Актовегин	Раствор для инъекций	В составе комплексной терапии: - симптоматическое лечение когнитивных нарушений, включая постинсультные когнитивные нарушения и деменцию; - симптоматическое лечение

				<p>нарушений периферического кровообращения и их последствий;</p> <p>- симптоматическое лечение диабетической полинейропатии (ДПН)</p>
V09BA	Соединения технеция/ Радиофармацевтическое диагностическое средство	Резоскан, 99mTc	Лиофилизат для приготовления раствора для в/в введения	<p>Используется для выявления очагов патологической резорбции и участков повышенного метаболизма в костной ткани при различных патологических процессах в скелете:</p> <p>- для выявления и идентификации литических, смешанных и бластных метастазов в скелете, при злокачественных опухолях различного происхождения и распространенности,</p> <p>- при остеомиелите, костно-суставном туберкулезе, остеопорозе, различных костно-суставных дегенеративных процессах, в том числе при артритах и артрозах различного происхождения,</p> <p>- для выбора специфической терапии костных поражений препаратами золедроновой кислоты и контроля эффективности лечения</p>
V09EB01	Соединения технеция/ другие диагностические средства	Макротех 99mTc	Лиофилизат для приготовления раствора для в/в введения	<p>Для перфузионной сцинтиграфии легких при:</p> <p>- тромбоэмболии легочной артерии, инфаркте легкого;</p> <p>- хронических обструктивных заболеваниях легких;</p> <p>- регионарных нарушениях вентиляции легких;</p> <p>- эмфиземе легких</p> <p>Для проведения радиоизотопной флебографии при:</p> <p>- тромбозах глубоких вен нижних конечностей и таза;</p> <p>- обструкции (окклюзии) нижней полой вены</p>
V09GA01	Соединения технеция/ другие диагностические средства	Технетрил 99mTc	Лиофилизат для приготовления раствора для в/в введения	<p>Для оценки перфузии миокарда при различных патологических процессах, приводящих к нарушению его кровоснабжения (коронарный атеросклероз, острый инфаркт миокарда, постинфарктный и постмиокардитический кардиосклероз, ишемическая болезнь сердца), а также для визуализации злокачественных новообразований легких и молочной железы</p>
D08AG	Препараты йода/ Антисептики и	Повидон-йод + калия йодид	раствор для наружного	Обеззараживание рук хирурга, операционного поля,

	дезинфицирующие средства в комбинациях		применения	хирургических перчаток и локтевых сгибов доноров, ожоги, гнойные и инфицированные раны, остеомиелит
B05BB01	Калия хлорид/ Регуляторы водно-электролитного баланса и КЩС в комбинациях Заменители плазмы и других компонентов крови в комбинациях	Натрия хлорида раствор сложный (Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид)	Раствор для инфузий	Гиповолемический шок, острая кровопотеря, дегидратация и нарушение электролитного баланса (термические ожоги 3 и 4 степени), коррекция водно-солевого баланса при остром разлитом перитоните и кишечной непроходимости, кишечный свищ, острая кишечная инфекция (тяжелое течение, невозможность приема регидратирующих средств для перорального приема), лечебный плазмаферез
B05XA01	Калия хлорид/ Регуляторы водно-электролитного баланса и КЩС в комбинациях	Калия хлорид + Декстроза	Раствор для инфузий	Лечение и профилактика гипокалиемии различного генеза (в том числе аритмий, обусловленных гипокалиемией)